

PAXLOVID - BAZÁLNÍ MANAGEMENT LÉKOVÝCH INTERAKCÍ

Tabulka je primárně určena pro praktické lékaře a lékaře oddělení urgentního příjmu pro rychlou orientaci v problematice lékových interakcí (LINT) léčivého přípravku Paxlovid.



Léková skupina, léčivá látka	Bazální management LINT
Analgetika	
diklofenak, ibuprofen, paracetamol	bez LINT s Paxlovidem
fentanyl, oxykodon, tramadol	snížit dávku o 50 %, monitorace pacienta - riziko sedace či použít jiné antivirotikum
Antiagregancia	
ASA	bez LINT s Paxlovidem
klopidogrel	použít jiné antivirotikum
prasugrel	bez LINT s Paxlovidem
tikagrelor	použít jiné antivirotikum
Antiarytmika	
amiodaron	použít jiné antivirotikum
digoxin, ivabradin	použít jiné antivirotikum
propafenon	použít jiné antivirotikum
Antibiotika	
klarithromycin	použít azithromycin
rifampicin	použít jiné antivirotikum
ostatní antibiotika	bez LINT s Paxlovidem
Antidepresiva	
citalopram, escitalopram, venlafaxin	bez LINT s Paxlovidem
fluoxetin, fluvoxamin, paroxetin, sertralin	monitorace pacienta - riziko sedace (zvláště pokud jsou podávány vyšší dávky)
Antidiabetika	
inzulin	bez LINT s Paxlovidem
perorální antidiabetika	bez LINT s Paxlovidem
Antihistaminika	
cetirizin	bez LINT s Paxlovidem
fexofenadin, loratadin, rupatadin	vysadit po dobu užívání Paxlovidu

Léková skupina, léčivá látka	Bazální management LINT
Antihypertenziva	
ACEI, sartany	bez LINT s Paxlovidem
betablokátory	bez LINT s Paxlovidem
amlodipin, diltiazem, felodipin, nifedipin, nitrendipin	snížit dávku, monitorace TK
lerkanidipin	použít jiné antivirotikum
centrální: rilmenidin, moxonidin, methyl-dopa, urapidil	bez LINT s Paxlovidem
diuretika	bez LINT s Paxlovidem
doxazosin	snížit dávku, monitorace TK
eplerenon	použít jiné antivirotikum
nitráty	bez LINT s Paxlovidem
spironolakton	bez LINT s Paxlovidem
Antikoagulancia	
apixaban, dabigatran, rivaroxaban	použít jiné antivirotikum
edoxaban	snížit dávku na 30 mg/den
warfarin	použít jiné antivirotikum
LMWH	bez LINT s Paxlovidem
Antikoncepce	
	bez LINT s Paxlovidem
Antikonvulziva	
fenobarbital, fenytoin, karbamazepin	použít jiné antivirotikum
gabapentin, levetiracetam, pregabalin	bez LINT s Paxlovidem
Antimykotika	
flukonazol	bez LINT s Paxlovidem
itrakonazol, vorikonazol	použít jiné antivirotikum

PAXLOVID - BAZÁLNÍ MANAGEMENT LÉKOVÝCH INTERAKCÍ

Tabulka je primárně určena pro praktické lékaře a lékaře oddělení urgentního příjmu pro rychlou orientaci v problematice lékových interakcí (LINT) léčivého přípravku Paxlovid.



Léková skupina, léčivá látka	Bazální management LINT
Antipsychotika	
klozapin, quetiapin	použít jiné antivirotikum
tiaprid	bez LINT s Paxlovidem
Antitusika	
butamirát, levodropropizin	bez LINT s Paxlovidem
kodein	riziko sedace pacienta, dávku nutné titrovat
Benzodiazepiny, hypnotika	
alprazolam, zolpidem	snížit dávku o 50 %
diazepam, klonazepam, midazolam	použít jiné antivirotikum
bromazepam, oxazepam	bez LINT s Paxlovidem
Hormony štítné žlázy	
	bez LINT s Paxlovidem
Hypolipidemika	
fibráty	bez LINT s Paxlovidem
statiny	vysadit po dobu užívání Paxlovidu/časně po AKS použít jiné antivirotikum

Léková skupina, léčivá látka	Bazální management LINT
Inhalační bronchodilatační medikace	
salmeterol	použít jiné beta2mimetikum či jiné antivirotikum
ostatní	bez LINT s Paxlovidem
Inhibitory protonové pumpy	
	bez LINT s Paxlovidem
Kortikosteroidy (orální, inhalační, topické)	
	bez LINT s Paxlovidem
Léčiva v terapii BHP	
alfuzosin, silodosin, tamsulosin	vysadit po dobu užívání Paxlovidu
finasterid	bez LINT s Paxlovidem
Léčiva v terapii hyperaktivního močového měchýře	
darifenacin, fesoterodin, solifenacin, tolterodin	vysadit po dobu užívání Paxlovidu

Znovunasazení léčiva: 72 hod. po ukončení terapie Paxlovid.

Nenajdete-li léčivé látky v této základní tabulce, je doporučeno:

1. zkontrolovat SPC či použít některou z dostupných interakčních databází: <https://lekveinterakce.cz>; <https://www.covid19-druginteractions.org/checker>
2. telefonicky konzultovat klinického farmaceuta: <https://www.coskf.cz/pracoviste>
3. podat jiné antivirotikum: molnupiravir p.o., remdesivir i.v.

Jedná-li se o specifické skupiny pacientů, kteří užívají např. imunosupresiva, onkologika, antiretrovirotika nebo centrovou léčbu, konzultujte příslušného specialistu či použijte jiné antivirotikum.

Zpracovala: Pracovní skupina pro farmakoterapii COVID-19 České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP a Společnost infekčního lékařství ČLS JEP dne 14. 07. 2022

Vysvětlivky k barvám: zeleně – bez LINT s Paxlovidem, tj. použít Paxlovid
 černě – použít Paxlovid, ale za uvedených podmínek
 červeně – použít jiné antivirotikum