

Lansoprazol (suspenze)

Přehled přípravků, pro které platí uvedené doporučení:

Simplifikovaná suspenze

Substance:

Lansoprazol

Léková forma:

Alkalická suspenze

Receptura:

Rp.

Lansoprazoli 1 cps á 30 mg

Natrii hydrogencarbonas 8,4% sol. 10 ml

M. f. susp.

Postup přípravy: Otevřete tobolky a vysypte jejich obsah (pelety) do vhodné nádoby. Přidejte 10 ml bikarbonátu sodného a nechte alespoň 15 min stát (do rozpuštění acidorezistentního obalu). Důkladně protřepejte, aby vznikla suspenze.

Uchovávání: K okamžité spotřebě.

Upozornění pro lékaře:

- Podání přípravku sondou je postupem off-label!
- Nelze vyloučit snížení účinku léčiva – monitorujte klinickou účinnost, případně aciditu žaludečního obsahu!

POSTUP PŘI PODÁNÍ SONDOU

- Úpravu léčiva provádějte těsně před podáním do sondy!
- U pacientů, u kterých je sledována bilance tekutin, započítejte množství vody použité na přípravu léčiva a proplachy sondy do celkového denního příjmu tekutin!

Postup při podání sondou do žaludku:

1. Přerušete podávání výživy (při bolusovém či cyklickém režimu výživy časujte podání léčiva na konec nejdelší denní pauzy v podávání výživy).
2. Propláchněte sondu 15 ml převařené vody pokojové teploty.
3. Protřepejte dostatečně lahvičku/nádobu s léčivem.
4. Natáhněte požadovaný objem léčiva do injekční stříkačky a podejte do sondy.
5. Propláchněte sondu 15 ml převařené vody pokojové teploty.
6. Vyčkejte 30 min.
7. Obnovte podávání výživy.

Postup při podání sondou do duodena/jejuna:

1. Postupujte stejným způsobem jako při podání sondou do žaludku.

Autor: PharmDr. Lenka Dundelová

Aktualizace: 5. 12. 2021