

# Metformin

## **Přehled přípravků, pro které platí uvedené doporučení:**

Glucophage tbl flm  
Metfogamma tbl flm  
Metformin Aurovitas tbl flm  
Metformin Mylan tbl flm  
Metformin Sandoz tbl flm  
Metformin Teva tbl flm  
Metformin Vitabalans tbl flm  
Metformin Zentiva tbl flm  
Normaglyc tbl flm  
Siofor tbl flm  
Stadamet tbl flm

## **Substance:**

Metformin hydrochlorid

## **Léková forma:**

Tableta, obalená, s okamžitým uvolňováním účinné látky

## **Upozornění pro lékaře:**

- Podání přípravku sondou je postupem off-label!
- Nelze vyloučit snížení účinku léčiva při podání do distálních úseků střeva – monitorujte klinickou účinnost!  
→ V případě snížení účinku může být řešením rozdělit dávku do více dílčích dávek.

## **POSTUP PŘI PODÁNÍ SONDOU**

- Úpravu léčiva provádějte těsně před podáním do sondy!
- U pacientů, u kterých je sledována bilance tekutin, započítejte množství vody použité na přípravu léčiva a proplachy sondy do celkového denního příjmu tekutin!

### **Postup při podání sondou do žaludku:**

1. Přerušete podávání výživy.
2. Propláchněte sondu 15 ml převařené vody pokojové teploty.
3. Umístěte tabletu do misky a tloučkem ji rozdrťte na jemný prach.
4. Přidejte do misky 10 ml převařené vody pokojové teploty a promíchejte.
5. Vzniklou suspenzi natáhněte do injekční stříkačky.
6. Protřepejte suspenzi léčiva ve stříkačce a podejte ji do sondy.
7. Poté přidejte do drtící misky znovu 10 ml převařené vody pokojové teploty, promíchejte, natáhněte do stříkačky, protřepejte a podejte do sondy.
8. Propláchněte sondu 15 ml převařené vody pokojové teploty.
9. Obnovte podávání výživy.

### **Postup při podání sondou do duodena/jejuna:**

1. Postupujte stejným způsobem jako při podání sondou do žaludku.

**Autor:** Mgr. Bc. Tereza Cikánková, Ph.D.

**Aktualizace:** 30. 3. 2021