

# Metoprolol

## **Přehled přípravků, pro které platí uvedené doporučení:**

Egilok tbl nob  
Metoprolol Aurovitas tbl flm  
Vasocardin tbl nob

## **Substance:**

Metoprolol tartarát

## **Léková forma:**

Egilok tbl nob, Vasocardin tbl nob:  
Tableta, neobalená, s okamžitým uvolňováním účinné látky  
Metoprolol Aurovitas tbl flm:  
Tableta, potahovaná, s okamžitým uvolňováním účinné látky

## **Upozornění pro lékaře:**

- Podání přípravku sondou je postupem off-label!

## **Alternativy:**

Využitelnost konkrétní alternativy v konkrétním klinickém případě musí posoudit ošetřující lékař!

- Metoprolol k podání sondou: Betaloc ZOK, Bloxazoc (metoprolol ve formě potahované tablety tvořené mikropeletami, s prodlouženým uvolňováním účinné látky vázaným na mikropelety – viz příslušné doporučení). Výhodou je možnost podat celou denní dávku najednou. CAVE, v tabletách s prodlouženým uvolňováním účinné látky je metoprolol přítomen ve formě jiné soli (sukcinátu). Sukcinát a tartarát nejsou dávkově zcela ekvivalentní – při převodech se tento rozdíl však nezohledňuje, tj. celková denní dávka metoprololu zůstává beze změny. Nicméně, monitorujte klinickou účinnost a případný výskyt nežádoucích účinků!

## **POSTUP PŘI PODÁNÍ SONDOU**

- Úpravu léčiva provádějte těsně před podáním do sondy!
- Některé přípravky mají zvláštní lékovou formu (tableta se speciální úpravou) – je nezbytné pečlivě dodržet níže uvedený postup, aby se minimalizovalo riziko okluze sondy!
- U pacientů, u kterých je sledována bilance tekutin, započítejte množství vody použité na přípravu léčiva a proplachy sondy do celkového denního příjmu tekutin!

### **Postup při podání sondou do žaludku:**

1. Přerušete podávání výživy.
2. Propláchněte sondu 15 ml převařené vody pokojové teploty.
3. Umístěte tabletu do misky a tloučkem ji rozdrťte na jemný prach.
4. Přidejte do misky 10 ml převařené vody pokojové teploty a promíchejte.
5. Vzniklou suspenzi natáhněte do injekční stříkačky.
6. Protřepejte suspenzi léčiva ve stříkačce a podejte ji do sondy.
7. Poté přidejte do drtící misky znovu 10 ml převařené vody pokojové teploty, promíchejte, natáhněte do stříkačky, protřepejte a podejte do sondy.
8. Propláchněte sondu 15 ml převařené vody pokojové teploty.
9. Obnovte podávání výživy.

### **Postup při podání sondou do duodena/jejuna:**

1. Postupujte stejným způsobem jako při podání sondou do žaludku.

**Autor:** Mgr. Helena Šťastná Koblihová

**Aktualizace:** 15. 3. 2022