

Metoprolol ZOK

Přehled přípravků, pro které platí uvedené doporučení:

Betaloc ZOK tbl pro

Bloxazoc tbl pro

Substance:

Metoprolol sukcinát

Léková forma:

Tableta, potahovaná, tvořená mikropoletami, s prodlouženým uvolňováním účinné látky (vázaným na mikropolety)

Upozornění pro lékaře:

- Podání přípravku sondou je postupem off-label!

POSTUP PŘI PODÁNÍ SONDOU

- Úpravu léčiva provádějte těsně před podáním do sondy!
- Zvláštní léková forma (s prodlouženým uvolňováním léčiva) – je nezbytné pečlivě dodržet níže uvedený postup, aby byl zachován charakter uvolňování léčiva a minimalizovalo se riziko okluze sondy!
- U pacientů, u kterých je sledována bilance tekutin, započítejte množství vody použité na přípravu léčiva a proplachy sondy do celkového denního příjmu tekutin!

Postup při podání sondou do žaludku:

1. Přerušete podávání výživy.
2. Propláchněte sondu 15 ml převařené vody pokojové teploty.
3. Umístěte tabletu do injekční stříkačky a přidejte 10 ml převařené vody pokojové teploty.
4. Za pečlivého protřepávání nechte tabletu ve vodě rozpadnout. Výsledná suspenze nesmí obsahovat žádné velké viditelné částice či shluky částic.
5. Protřepejte suspenzi léčiva ve stříkačce a podejte ji do sondy.
6. Natáhněte do stejné stříkačky znovu 10 ml převařené vody pokojové teploty a podejte je do sondy.
7. Propláchněte sondu 15 ml převařené vody pokojové teploty.
8. Obnovte podávání výživy.

Postup při podání sondou do duodena/jejuna:

1. Postupujte stejným způsobem jako při podání sondou do žaludku.

Autor: Mgr. Helena Šťastná Koblihová

Aktualizace: 15. 3. 2022