

## Takrolimus (tableta) – forma s prodlouženým uvolňováním účinné látky

### **Přehled přípravků, pro které platí uvedené doporučení:**

Envarsus tbl pro

### **Substance:**

Takrolimus

### **Léková forma:**

Tableta, s prodlouženým uvolňováním účinné látky

### **Upozornění pro lékaře:**

- Přípravek není vhodný pro podání sondou!  
→ Léková forma neumožňuje akceptovatelný způsob úpravy léčiva pro podání sondou.

### **Alternativy:**

Využitelnost konkrétní alternativy v konkrétním klinickém případě musí posoudit ošetřující lékař!

- Takrolimus k podání sondou ve formě s prodlouženým uvolňováním léčiva: Advagraf cps pro – viz příslušné doporučení. CAVE, převod je nutné provést v poměru 0,7:1 (mg:mg) celkové denní dávky (tj. denní dávka přípravku Advagraf bude o 30 % vyšší, než byla dávka přípravku Envarsus), za monitorování plazmatické koncentrace léčiva a pod dohledem transplantologa.
- Takrolimus k intravenóznímu podání: Prograf inf cnc sol. Intravenózní podání může být alternativou v případě problematického dosažení terapeutické koncentrace takrolimu při podání do jejunu a distálnějších úseků střeva. CAVE, při převodu z perorálních forem je nutné upravit dávkování, převod realizovat za monitorování plazmatické koncentrace léčiva a pod dohledem transplantologa.

**Autor:** PharmDr. Kateřina Žáková

**Aktualizace:** 12. 10. 2021