

# Tikagrelor (tableta dispergovatelná v ústech)

## **Přehled přípravků, pro které platí uvedené doporučení:**

Brilique por tbl dis

### **Substance:**

Tikagrelor

### **Léková forma:**

Tableta, dispergovatelná v ústech, s okamžitým uvolňováním účinné látky

### **Upozornění pro lékaře:**

- Podání přípravku sondou do žaludku je postupem on-label.
- Lécivo není vhodné pro podání sondou do duodena/jejuna!  
→ Riziko snížení koncentrace a účinku léčiva při podání do distální části tenkého střeva.

### **Alternativy:**

Využitelnost konkrétní alternativy v konkrétním klinickém případě musí posoudit ošetřující lékař!

- Terapeutická alternativa k podání sondou: Jiná protidestičková léčiva – viz příslušná doporučení.

## **POSTUP PŘI PODÁNÍ SONDOU**

- Úpravu léčiva provádějte těsně před podáním do sondy!
- U pacientů, u kterých je sledována bilance tekutin, započítejte množství vody použité na přípravu léčiva a proplachy sondy do celkového denního příjmu tekutin!

### **Postup při podání sondou do žaludku (průměr > 8 F):**

1. Přerušete podávání výživy.
2. Propláchněte sondu 15 ml převařené vody pokojové teploty.
3. Vyměňte píst a umístěte tabletu do injekční stříkačky.
4. Natáhněte do stříkačky 10 ml převařené vody pokojové teploty.
5. Za pečlivého protřepávání nechte tabletu ve vodě rozpadnout. Výsledná suspenze nesmí obsahovat žádné výrazně velké částice či shluky částic.
6. Protřepejte suspenzi léčiva a podejte ji do sondy.
7. Natáhněte do stejné stříkačky znovu 10 ml převařené vody pokojové teploty a podejte je do sondy.
8. Propláchněte sondu 15 ml převařené vody pokojové teploty.
9. Obnovte podávání výživy.

### **Postup při podání sondou do duodena/jejuna:**

1. Lécivo není vhodné pro podání sondou do duodena/jejuna!

**Autor:** Mgr. Helena Šťastná Koblihová

**Aktualizace:** 8. 4. 2021