

# Vorikonazol

## **Přehled přípravků, pro které platí uvedené doporučení:**

Vfend tbl flm	Voriconazole Teva tbl flm
Voriconazole Accord tbl flm	Vorikonazol Mylan tbl flm
Voriconazole Olikla tbl flm	Vorikonazol Sandoz tbl flm

## **Substance:**

Vorikonazol

## **Léková forma:**

Tableta, potahovaná, s okamžitým uvolňováním účinné látky

## **Upozornění pro lékaře:**

- Podání přípravku sondou je postupem off-label!
- Nelze vyloučit změnu účinku léčiva při podání do distálních úseků tenkého střeva – monitorujte plazmatickou koncentraci léčiva a klinickou účinnost!

## **Alternativy:**

Využitelnost konkrétní alternativy v konkrétním klinickém případě musí posoudit ošetřující lékař!

- Vorikonazol k intravenóznímu podání: Intravenózní podání může být alternativou v případě problematického dosažení potřebných plazmatických koncentrací a klinického účinku vorikonazolu při podání sondou.

## **POSTUP PŘI PODÁNÍ SONDOU**

- Úpravu léčiva provádějte těsně před podáním do sondy!
- Zvláštní léková forma (tableta se speciální úpravou) – je nezbytné pečlivě dodržet níže uvedený postup, aby se minimalizovalo riziko okluze sondy!
- U pacientů, u kterých je sledována bilance tekutin, započítejte množství vody použité na přípravu léčiva a proplachy sondy do celkového denního příjmu tekutin!
- Při úpravě léčiva používejte standardní osobní ochranné prostředky!  
→ Nelze vyloučit riziko podráždění očí, pokožky a dýchacího systému.  
→ Studie na zvířatech prokázaly reprodukční toxicitu vorikonazolu, riziko pro člověka není známé (relevantní pro těhotné ženy nebo ženy plánující těhotenství).

### **Postup při podání sondou do žaludku:**

1. Přerušete podávání výživy.
2. Propláchněte sondu 15 ml převařené vody pokojové teploty.
3. Vyčkejte alespoň 1 h (ideálně 2 h).
4. Umístěte tabletu do misky a tloučkem ji rozdrťte na jemný prach.
5. Přidejte do misky 10 ml převařené vody pokojové teploty a promíchejte.
6. Vzniklou suspenzi natáhněte do injekční stříkačky.
7. Protřepejte suspenzi léčiva ve stříkačce a podejte ji do sondy.
8. Poté přidejte do drtící misky znovu 10 ml převařené vody pokojové teploty, promíchejte, natáhněte do stříkačky, protřepejte a podejte do sondy.
9. Propláchněte sondu 15 ml převařené vody pokojové teploty.
10. Vyčkejte alespoň 1 h (ideálně 2 h).
11. Obnovte podávání výživy.

### **Postup při podání sondou do duodena/jejuna:**

1. Postupujte stejným způsobem jako při podání sondou do žaludku.

**Autor:** PharmDr. Gabriela Vaculová, PharmDr. Alena Linhartová

**Aktualizace:** 17. 2. 2022