

Citalopram (perorální kapky/roztok)

Přehled přípravků, pro které platí uvedené doporučení:

Seropram por gtt sol

Substance:

Citalopram hydrochlorid

Léková forma:

Perorální kapky/roztok

Upozornění pro lékaře:

- Podání přípravku sondou je postupem off-label!
- Při převodu z tabletové formy je třeba upravit dávkování: tableta 10 mg = roztok 8 mg (tj. roztok 4 kapky)!

POSTUP PŘI PODÁNÍ SONDOU

- Úpravu léčiva provádějte těsně před podáním do sondy!
- U pacientů, u kterých je sledována bilance tekutin, započítejte množství vody použité na přípravu léčiva a proplachy sondy do celkového denního příjmu tekutin!

Postup při podání sondou do žaludku:

1. Přerušete podávání výživy.
2. Propláchněte sondu 15 ml převařené vody pokojové teploty.
3. Odpočítejte požadovaný počet kapek z originální lahvičky s kapátkem do sklenky s 10 ml převařené vody pokojové teploty, promíchejte.
4. Vzniklý roztok natáhněte do injekční stříkačky a podejte do sondy.
5. Propláchněte sondu 15 ml převařené vody pokojové teploty.
6. Obnovte podávání výživy.

Postup při podání sondou do duodena/jejuna:

1. Postupujte stejným způsobem jako při podání sondou do žaludku.

Autor: PharmDr. Alena Linhartová

Aktualizace: 20. 11. 2018