

# Citalopram (potahovaná tableta)

## **Přehled přípravků, pro které platí uvedené doporučení:**

Apo-Cital tbl flm	Citalopram Vitabalans potahované tablety tbl flm
Citalec Zentiva tbl flm	Citalopram-Teva tbl flm
Citalon tbl flm	Pram tbl flm
Citalopram +pharma tbl flm	Seropram tbl flm
Citalopram Orion tbl flm	

## **Substance:**

Citalopram hydrobromid

## **Léková forma:**

Tableta, potahovaná, s okamžitým uvolňováním účinné látky

## **Upozornění pro lékaře:**

- Podání přípravku sondou je postupem off-label!

## **Alternativy:**

Využitelnost konkrétní alternativy v konkrétním klinickém případě musí posoudit ošetřující lékař!

- Citalopram k podání sondou: Seropram por gtt sol (citalopram ve formě perorálních kapek/roztoku – viz příslušné doporučení). Výhodou jsou menší nároky na úpravu léčiva před podáním sondou. CAVE, při převodu z tabletové formy je třeba upravit dávkování: tableta 10 mg = roztok 8 mg (tj. roztok 4 kapky).

## **POSTUP PŘI PODÁNÍ SONDOU**

- Úpravu léčiva provádějte těsně před podáním do sondy!
- U pacientů, u kterých je sledována bilance tekutin, započítejte množství vody použité na přípravu léčiva a proplachy sondy do celkového denního příjmu tekutin!
- Zvláštní léková forma (tableta se speciální úpravou) – je nezbytné pečlivě dodržet níže uvedený postup, aby se minimalizovalo riziko okluze sondy!

### **Postup při podání sondou do žaludku:**

1. Přerušete podávání výživy.
2. Propláchněte sondu 15 ml převařené vody pokojové teploty.
3. Umístěte tabletu do misky a tloučkem ji rozdrťte na jemný prach.
4. Přidejte do misky 10 ml převařené vody pokojové teploty a promíchejte.
5. Vzniklou suspenzi natáhněte do injekční stříkačky.
6. Protřepejte suspenzi léčiva ve stříkačce a podejte ji do sondy.
7. Poté přidejte do drtící misky znovu 10 ml převařené vody pokojové teploty, promíchejte, natáhněte do stříkačky, protřepejte a podejte do sondy.
8. Propláchněte sondu 15 ml převařené vody pokojové teploty.
9. Obnovte podávání výživy.

### **Postup při podání sondou do duodena/jejuna:**

1. Postupujte stejným způsobem jako při podání sondou do žaludku.

**Autor:** PharmDr. Alena Linhartová

**Aktualizace:** 20. 11. 2018