

Metoprolol

Přehled přípravků, pro které platí uvedené doporučení:

Apo-metoprolol tbl nob
Egilok tbl nob
Metoprolol AL tbl nob
Vasocardin tbl nob

Substance:

Metoprolol tartarát

Léková forma:

Tableta, neobalená, s okamžitým uvolňováním účinné látky

Upozornění pro lékaře:

- Podání přípravku je postupem off-label!
- U pacientů, u kterých je sledována bilance tekutin, započítejte množství vody použité na přípravu léčiva a proplachy sondy do celkového denního příjmu tekutin!

Přípustné alternativy:

- Metoprolol ve formě injekčního roztoku k i.v. podání – nelze, indikován pouze pro akutní stavy.
- Metoprolol ve formě ZOK (viz příslušné doporučení):
 - Při převodu z neretardovaného na retardovaný přípravek je třeba upravit dávkování: celkovou denní dávku ponechat beze změny, podat ji však najednou (tj. v jedné denní dávce).
 - V retardovaných tabletách je metoprolol přítomen ve formě jiné soli (sukcinátu). Sukcinát a tartarát nejsou dávkově zcela ekvivalentní - při převodech se tento rozdíl však nezohledňuje, tj. celková denní dávka metoprololu zůstává beze změny. Nicméně, monitorujte klinickou účinnost a případný výskyt nežádoucích účinků!

POSTUP PŘI PODÁNÍ SONDOU

- Úpravu léčiva provádějte těsně před podáním do sondy!
- U pacientů, u kterých je sledována bilance tekutin, započítejte množství vody použité na přípravu léčiva a proplachy sondy do celkového denního příjmu tekutin!

Postup při podání sondou do žaludku:

1. Přerušte podávání výživy (při bolusovém režimu výživy časujte podání léčiva bezprostředně po podání bolusu, při cyklickém režimu výživy časujte podání léčiva v průběhu či bezprostředně po ukončení cyklu).
2. Propláchněte sondu 15 ml převařené vody pokojové teploty.
3. Umístěte tabletu do misky a tloučkem ji rozdrťte na jemný prach.
4. Přidejte do misky 10 ml převařené vody pokojové teploty a promíchejte.
5. Vzniklou suspenzi natáhněte do injekční stříkačky.
6. Protřepejte suspenzi léčiva ve stříkačce a podejte ji do sondy.
7. Poté přidejte do drtící misky znovu 10 ml převařené vody pokojové teploty, promíchejte, natáhněte do stříkačky, protřepejte a podejte do sondy.
8. Propláchněte sondu 15 ml převařené vody pokojové teploty.
9. Obnovte podávání výživy.

Postup při podání sondou do duodena/jejuna:

1. Postupujte stejným způsobem jako při podání sondou do žaludku.

Autor: Mgr. Helena Šťastná Koblihová

Aktualizace: 10. 2. 2017