

Omeprazol (tvrdá tobolka obsahující enterosolventní pelety)

Přehled přípravků, pro které platí uvedené doporučení:

Apo-Ome por cps edt	Omeprazol Actavis por cps edt	Omeprazol Teva Pharma por cps edt
Gasec por cps edt	Omeprazol AL por cps edt	Onprelen por cps edt
Helicid por cps edt	Omeprazol Farmax por cps edt	Ortanol por cps edt
Lomac por cps edt	Omeprazol Galmed por cps edt	Ultop por cps edt
Loseprazol por cps edt	Omeprazol Mylan por cps edt	
Moprilic por cps edt	Omeprazol Stada por cps edt	

Substance:

Omeprazol

Léková forma:

Tvrdá tobolka obsahující enterosolventní pelety

Upozornění pro lékaře:

- Podání přípravku sondou je postupem off-label!
- Při podání léčiva do žaludku je nezbytné zachovat acidorezistentní ochranu léčivé látky, jinak hrozí selhání účinku léčby, u podání do střeva chrání acidorezistentní úprava před degradací léčiva v sondě.
- Nelze vyloučit okluzi sondy léčivem při podání sondou s užším průměrem (< 16 F)! – viz alternativy.
- Pokud to režim umožňuje, podávejte omeprazol po nejdelsí pauze v podání výživy a tu zahajte až 30 minut po podání léčiva.
- Při kontinuálním podání výživy nebo při zpomalené evakuaci žaludku hrozí snížení účinku léčiva – monitorujte klinickou účinnost (případně aciditu žaludečního obsahu)!
- U pacientů, u kterých je sledována bilance tekutin, započítejte množství vody použité pro podání léčiva a proplachy sondy do celkového denního příjmu tekutin!

Vhodnější alternativy:

- Podání esomeprazolu do NG sond o průměru nad 8-10 F je on-label postupem.
- Podání omeprazolu do sond je ze všech PPI nejlépe zdokumentováno.
- Pro podání do tenkých sod použijte alkalickou suspenzi omeprazolu!

POSTUP PŘI PODÁNÍ SONDOU:

- Úpravu léčiva provádějte těsně před podáním do sondy!
- Pro podání pelet je třeba používat vhodné odměrky či stříkačky se širokým ústím (ústím stříkačky musí projít celé pelety).
- U pacientů s restrikcí příjmu tekutin započítejte množství vody použité na přípravu léčiva a proplachy sondy do celkového denního příjmu tekutin!

Postup při podání do žaludku širokou sondou (průměr ≥ 16 F):

1. Přerušete podávání výživy (při bolusovém či cyklickém režimu výživy časujte podání léčiva na konec nejdelsí denní pauzy v podávání výživy).
2. Propláchněte sondu 15 ml převařené vody pokojové teploty.
3. Otevřete tvrdé tobolky a neporušené pelety vysypte do vhodné stříkačky.
4. Do stříkačky natáhněte 10 ml kyselého roztoku (jablečný/pomerančový džus).
5. Protřepete suspenzi pelet v kyselém roztoku a podejte ji do sondy.
6. Propláchněte sondu 15 ml převařené vody pokojové teploty.
7. Obnovte podávání výživy (pokud to režim umožňuje, tak až po 30 minutách).

Postup při podání do duodena/jejuna širokou sondou (průměr ≥ 16 F):

1. Postupujte stejným způsobem jako při podání sondou do žaludku.

Postup při podání úzkou sondou (průměr < 16 F):

1. Nelze, použijte alkalickou suspenzi omeprazolu či esomeprazol cps.