



Flukonazol

Přehled přípravků, pro které platí uvedené doporučení:

Diflucan cps dur 100 mg

Flukonazol Sandoz cps dur 100 mg

Substance:

Flukonazol

Léková forma:

Tobolka, tvrdá, obsahující prášek, s okamžitým uvolňováním účinné látky

Upozornění pro lékaře:

Podání přípravku sondou je postupem off-label!

POSTUP PŘI PODÁNÍ SONDOU

Úpravu léčiva provádějte těsně před podáním do sondy!

U pacientů, u kterých je sledována bilance tekutin, započítejte množství vody použité na přípravu léčiva a proplachy sondy do celkového denního příjmu tekutin!

Postup při podání sondou do žaludku:

Přerušete podávání výživy.

Propláchněte sondu 15 ml převařené vody pokojové teploty.

Otevřete tobolku a vysypte její obsah do kádinky.

Přidejte 10 ml převařené vody pokojové teploty (množství vody úměrně navyšte v případě podávání dávky výrazně vyšší než 100 mg).

Krouživými pohyby promíchejte, suspenze vznikne během 1 min.

Vzniklou suspenzi natáhněte do injekční stříkačky.

Protřepejte suspenzi léčiva ve stříkačce a podejte ji do sondy.

Poté přidejte do kádinky znovu 10 ml převařené vody pokojové teploty, promíchejte, natáhněte do stříkačky, protřepejte a podejte do sondy.

Propláchněte sondu 15 ml převařené vody pokojové teploty.

Obnovte podávání výživy.

Postup při podání sondou do duodena/jejuna:

Postupujte stejným způsobem jako při podání sondou do žaludku.

Autor: Mgr. Michela Šlesingerová, PharmDr. Alena Linhartová, Mgr. Milena Čtveráčková

Aktualizace: 20. 3. 2021