

# Itrakonazol

## **Přehled přípravků, pro které platí uvedené doporučení:**

Sporanox por sol

### **Substance:**

Itrakonazol

### **Léková forma:**

Perorální roztok

### **Upozornění pro lékaře:**

- Podání přípravku sondou je postupem off-label!
- Vzhledem k možnému riziku osmotického dráždění sliznice trávicího traktu je vhodné naředit požadovanou dávku/objem roztoku léčiva vodou v poměru 1:5 (v případě, že by došlo k výskytu obtíží i přes toto opatření, pak v poměru 1:10, event. i vyšším).

## **POSTUP PŘI PODÁNÍ SONDOU**

- Úpravu léčiva provádějte těsně před podáním do sondy!
- K odměrování objemu léčiva je třeba používat injekční stříkačky s kalibrovanou stupnicí!
- U pacientů, u kterých je sledována bilance tekutin, započítejte množství vody použité na přípravu léčiva a proplachy sondy do celkového denního příjmu tekutin!

### **Postup při podání sondou do žaludku:**

1. Přerušete podávání výživy.
2. Propláchněte sondu 30 ml převařené vody pokojové teploty.
3. Vyčkejte 2 h.
4. Protřepejte dostatečně lahvičku s léčivem.
5. Odměřte požadovaný objem léčiva do sklenky, naředte převařenou vodou pokojové teploty v poměru 1:5, promíchejte.
6. Vzniklý roztok natáhněte do injekční stříkačky a podejte do sondy.
7. Propláchněte sondu 30 ml převařené vody pokojové teploty.
8. Vyčkejte 1 h.
9. Obnovte podávání výživy.

### **Postup při podání sondou do duodena/jejuna:**

1. Postupujte stejným způsobem jako při podání sondou do žaludku.

**Autor:** PharmDr. Alena Linhartová

**Aktualizace:** 17. 5. 2019