

Levetiracetam (perorální roztok)

Přehled přípravků, pro které platí uvedené doporučení:

Keppra por sol

Substance:

Levetiracetam

Léková forma:

Perorální roztok

Upozornění pro lékaře:

- Podání přípravku sondou je postupem off-label!
- Vzhledem k možnému riziku osmotického dráždění sliznice trávicího traktu je vhodné naředit požadovanou dávku/objem roztoku léčiva vodou v poměru 1:10.

POSTUP PŘI PODÁNÍ SONDOU

- Úpravu léčiva provádějte těsně před podáním do sondy!
- K odměrování objemu léčiva je třeba používat injekční stříkačky s kalibrovanou stupnicí!
- U pacientů, u kterých je sledována bilance tekutin, započítejte množství vody použité pro podání léčiva a proplachy sondy do celkového denního příjmu tekutin!

Postup při podání sondou do žaludku:

1. Přerušete podávání výživy.
2. Propláchněte sondu 15 ml převařené vody pokojové teploty.
3. Protřepejte dostatečně lahvičku s léčivem.
4. Odměřte požadovaný objem roztoku léčiva do sklenky, naředte převařenou vodou pokojové teploty v poměru 1:10, promíchejte.
5. Vzniklý roztok natáhněte do injekční stříkačky a podejte do sondy.
6. Propláchněte sondu 15 ml převařené vody pokojové teploty.
7. Obnovte podávání výživy.

Postup při podání sondou do duodena/jejuna:

1. Postupujte stejným způsobem jako při podání sondou do žaludku.

Autor: Mgr. Michaela Navrátilová

Aktualizace: 26. 4. 2019