

# Venlafaxin – forma s okamžitým uvolňováním účinné látky

**Přehled přípravků, pro které platí uvedené doporučení:**

Velaxin tbl nob

## **Substance:**

Venlafaxin hydrochlorid

## **Léková forma:**

Tableta, neobalená, s okamžitým uvolňováním účinné látky

## **Upozornění pro lékaře:**

- Podání přípravku sondou je postupem off-label!

## **Alternativy:**

Využitelnost konkrétní alternativy v konkrétním klinickém případě musí posoudit ošetřující lékař!

- Venlafaxin k podání sondou: Efextin ER cps pro (venlafaxin ve formě tvrdé tobolky obsahující sféroidy, s prodlouženým uvolňováním účinné látky vázaným na sféroidy – viz příslušné doporučení). Výhodou je možnost podat celou denní dávku najednou. Cave, podat lze pouze intaktní sféroidy, sonda proto musí mít širší vnitřní půrměr (>14 F).

## **POSTUP PŘI PODÁNÍ SONDOU**

- Úpravu léčiva provádějte těsně před podáním do sondy!
- U pacientů, u kterých je sledována bilance tekutin, započítejte množství vody použité na přípravu léčiva a proplachy sondy do celkového denního příjmu tekutin!

### **Postup při podání sondou do žaludku:**

1. Přerušte podávání výživy.
2. Propláchněte sondu 15 ml převařené vody pokojové teploty.
3. Umístěte tabletu do misky a tloučkem ji rozdrťte na jemný prach.
4. Přidejte do misky 10 ml převařené vody pokojové teploty a promíchejte.
5. Vzniklou suspenzi natáhněte do injekční stříkačky.
6. Protřepejte suspenzi léčiva ve stříkačce a podejte ji do sondy.
7. Poté přidejte do drtíci misky znova 10 ml převařené vody pokojové teploty, promíchejte, natáhněte do stříkačky, protřepejte a podejte do sondy.
8. Propláchněte sondu 15 ml převařené vody pokojové teploty.
9. Obnovte podávání výživy.

### **Postup při podání sondou do duodena/jejuna:**

1. Postupujte stejným způsobem jako při podání sondou do žaludku.

**Autor:** PharmDr. Alena Linhartová

**Aktualizace:** 10. 4. 2019