

Venlafaxin – forma s okamžitým uvolňováním léčiva

Přehled přípravků, pro které platí uvedené doporučení:

Velaxin tbl nob

Substance:

Venlafaxin hydrochlorid

Léková forma:

Tableta, neobalená, s okamžitým uvolňováním účinné látky

Upozornění pro lékaře:

- Podání přípravku sondou je postupem off-label!
- Nelze vyloučit snížení účinku léčiva při podání sondou do duodena/jejuna (zejm. do distálnějších částí střeva) – monitorujte klinickou účinnost!
- U pacientů, u kterých je sledována bilance tekutin, započítejte množství vody použité na přípravu léčiva a proplachy sondy do celkového denního příjmu tekutin!

Další alternativy:

Efectin ER cps pro – venlafaxin ve formě s prodlouženým uvolňováním léčiva (tvrdá tobolka obsahující sféroidy), viz příslušné doporučení. Výhodou je možnost podat celou denní dávku najednou. Cave – podat lze pouze intaktní sféroidy, sonda proto musí mít širší vnitřní průměr (> 14 F).

POSTUP PŘI PODÁNÍ SONDOU

- Úpravu léčiva provádějte těsně před podáním do sondy!
- U pacientů, u kterých je sledována bilance tekutin, započítejte množství vody použité na přípravu léčiva a proplachy sondy do celkového denního příjmu tekutin!

Postup při podání sondou do žaludku:

1. Přerušete podávání výživy.
2. Propláchněte sondu 15 ml převařené vody pokojové teploty.
3. Umístěte tabletu do misky a tloučkem ji rozdrťte na jemný prach.
4. Přidejte do misky 10 ml převařené vody pokojové teploty a promíchejte.
5. Vzniklou suspenzi natáhněte do injekční stříkačky.
6. Protřepejte suspenzi léčiva ve stříkačce a podejte ji do sondy.
7. Poté přidejte do drtící misky znovu 10 ml převařené vody pokojové teploty, promíchejte, natáhněte do stříkačky, protřepejte a podejte do sondy.
8. Propláchněte sondu 15 ml převařené vody pokojové teploty.
9. Obnovte podávání výživy.

Postup při podání sondou do duodena/jejuna:

1. Postupujte stejným způsobem jako při podání sondou do žaludku.

Autor: PharmDr. Alena Linhartová

Aktualizace: 9. 5. 2018