

# Warfarin

## **Přehled přípravků, pro které platí uvedené doporučení:**

Warfarin Orion tbl nob

Warfarin PMCS tbl nob

## **Substance:**

Warfarin Orion tbl nob: Warfarin sodná sůl

Warfarin PMCS tbl nob: Warfarin sodná sůl klatrát

## **Léková forma:**

Tableta, neobalená, s okamžitým uvolňováním účinné látky

## **Upozornění pro lékaře:**

- Léčivo s úzkým terapeutickým oknem!
- Podání přípravku sondou je postupem off-label!
- Podání léčiva sondou bude velmi pravděpodobně spojeno se snížením účinku – monitorujte INR, dle výsledku příp. upravte dávkování nebo použijte terapeutickou alternativu!
- Změna typu sondy (z gastrické na enterální či naopak) může být spojena se změnou účinku – monitorujte INR, dle výsledku příp. upravte dávkování nebo použijte terapeutickou alternativu!

## **Alternativy:**

Využitelnost konkrétní alternativy v konkrétním klinickém případě musí posoudit ošetřující lékař!

- Terapeutická alternativa k podání sondou: Některá non-vitamin K perorální antikoagulantia – viz příslušná doporučení.
- Terapeutická alternativa k parenterálnímu podání: Nefrakcionovaný heparin, nízkomolekulární heparin, fondaparinux.

## **POSTUP PŘI PODÁNÍ SONDOU**

- Úpravu léčiva provádějte těsně před podáním do sondy!
- U pacientů, u kterých je sledována bilance tekutin, započítejte množství vody použité na přípravu léčiva a proplachy sondy do celkového denního příjmu tekutin!

### **Postup při podání sondou do žaludku:**

1. Přerušete podávání výživy.
2. Propláchněte sondu 30 ml převařené vody pokojové teploty.
3. Vyčkejte alespoň 1 h (ideálně 2 h).
4. Umístěte tabletu do misky a tloučkem ji rozdrťte na jemný prach.
5. Přidejte do misky 10 ml převařené vody pokojové teploty a promíchejte.
6. Vzniklou suspenzi natáhněte do injekční stříkačky.
7. Protřepejte suspenzi léčiva ve stříkačce a podejte ji do sondy.
8. Poté přidejte do drtící misky znovu 10 ml převařené vody pokojové teploty, promíchejte, natáhněte do stříkačky, protřepejte a podejte do sondy.
9. Propláchněte sondu 30 ml převařené vody pokojové teploty.
10. Vyčkejte alespoň 1 h (ideálně 2 h).
11. Obnovte podávání výživy.

### **Postup při podání sondou do duodena/jejuna:**

1. Postupujte stejným způsobem jako při podání sondou do žaludku.

**Autor:** PharmDr. Alena Linhartová

**Aktualizace:** 4. 4. 2019